

Cécile Barbaret¹, Fiona Ecarnot², Raphaëlle Habert-Dantigny¹, Guillaume Economos³, Caroline Tête, Stéphane Sanchez⁴, Clemence Rasclé¹

¹ Univ. Grenoble Alpes, CNRS, CHU Grenoble Alpes, Grenoble INP, TIMC-IMAG, 38000 Grenoble, France

² Department of Cardiology, University Hospital Besançon Franche-Comté, 25000 Besançon, France

³ Department of palliative and supportive care, Centre Hospitalier Universitaire de Lyon Sud Hospital, 165 rue du Grand Revoyet, 69310 Pierre Bénite, France

⁴ Department of Public Health and Performance, Hôpitaux Champagne Sud, 101 rue Anatole France, 10000 Troyes, France

Pourquoi cette étude?

-Beaucoup d'auteurs ont étudiés si l'intervention d'une équipe spécialisée de SP pouvait réduire le nombre d'indicateurs d'agressivité des soins, mais les études utilisaient :

- *Diverses méthodes
- *Des populations hétérogènes
- *Parfois même de nouveaux indicateurs

-Objectif principal: décrire l'impact d'une intervention spécialisée de SP sur les indicateurs d'agressivité basées sur les études observationnelles et essais cliniques publiés depuis 2003

Resultats

-Sur 4830 references : 44 études incluses avec 10 expérimentales et 34 observationnelles

-La variable la plus étudiée sur l'intervention des soins palliatifs étaient: le binôme médecin-infirmier, l'hospice et l'ambulatorio.

-L'intervention d'une équipe spécialisée de SP semble avoir un impact plus important sur :

- > Le taux de chimiothérapie dans le dernier mois de vie
- > Le lieu du décès
- > Les admissions en USC et réanimation


Méthode

-Suivant les critères PRISMA-R

-Revue de toutes les études observationnelles, essais cliniques randomisés ou non sur MEDLINE et Web of Science de 2003 à 2026

-En se basant sur les critères d'éligibilité, deux revueurs indépendants ont sélectionnés les articles

Flow Chart



Conclusion

-Les études sont très hétérogènes sur :

- >Leurs méthodes
- >Leurs définitions
- >L'intervention de l'équipe de soins palliatifs

-De multiples biais existent rendant toutes généralisations difficiles

-L'étude de ces critères d'agressivité devraient se faire selon une nouvelle approche: selon les 3 niveaux de soins palliatifs.